FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Alergia, inmunología y reumatología

¿Qué necesito saber sobre el micofenolato de mofetilo?

(su pronunciación en inglés es "mye-koh-FEN-oh-late MOE-fah-til")
Otros nombres para este medicamento incluyen: CellCept®

Los medicamentos son una de las herramientas que su médico tiene para tratar su lupus. Tomar sus medicamentos como lo sugiere su médico mejorará su lupus y pueden prevenir problemas de salud más graves en el futuro. Si no toma sus medicamentos correctamente, puede poner en riesgo su salud y quizás su vida.

¿Por qué estoy tomando este medicamento?

Este medicamento le ayuda a controlar sus síntomas graves de lupus para que se sienta mejor. Y ayuda a prevenir los brotes.

El micofenolato de mofetilo funciona para ayudar a evitar que su sistema inmunitario ataque su cuerpo, especialmente los riñones (la parte de su cuerpo que limpia su sangre). Cuando toma este medicamento, es más difícil para su cuerpo combatir las infecciones.

¿Cómo tomo este medicamento?

- Su médico requiere que tome tabletas de______mg.
- Tome______tabletas por vía oral______veces al día.
- Tome este medicamento exactamente como lo indique su médico.
- Tome este medicamento con el estómago vacío. Eso significa que debe tomar este medicamento 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer.

¿Qué tan rápido funciona?

Pueden pasar de 8 a 12 semanas antes de que comience a sentirse mejor. Es posible que su médico necesite ajustar la cantidad de medicamento que toma.

Me siento mejor, ¿puedo dejar de tomar el medicamento?

No, incluso si se siente mejor, debe seguir tomando su medicamento. No deje de tomarlo a menos que su médico le indique que puede hacerlo. Es posible que deba tomarlo durante bastante tiempo hasta que su lupus esté muy bien controlado.

¿Hay algún efecto secundario?

Los efectos secundarios son síntomas (signos) o sensaciones no previstos que tiene cuando toma un medicamento. Algunos efectos secundarios ocurren justo cuando comienza a tomar un medicamento. Algunos ocurren solo de vez en cuando.

IMPORTANTE

Llame a su médico lo antes posible si tiene:

- Náuseas (se siente enfermo del estómago)
- Vómitos
- Diarrea (heces acuosas)
- Dolor de cabeza
- Mareos
- Temblores (músculos inestables o temblorosos)

La mayoría de los efectos secundarios no son graves y desaparecen por sí solos. Otros pueden ser más molestos e incluso graves. Dé seguimiento a los efectos secundarios. **Informe a su médico de inmediato sobre cualquier signo o cambio inesperado en la forma en que se siente.**

- Haga que su médico revise cualquier nueva aparición de sarpullido. Podría ser el medicamento o el lupus.
- Este medicamento puede disminuir la cantidad de células que combaten infecciones y otras células sanguíneas en su cuerpo. Necesitará análisis de sangre regulares para detectar estos problemas.

¿Qué cosas necesito saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Informe a su médico sobre todos los medicamentos que usa. Esto incluye recetas, medicamentos que compra en la tienda, vitaminas y productos herbales. No comience a tomar un nuevo medicamento sin primero informarlo a su médico.
- Es importante saber que muchos medicamentos no deben mezclarse con alcohol.
- Hable con sus médicos si está embarazada o si está pensando en quedar embarazada. El medicamento puede dañar al bebé nonato. Hable con sus médicos antes de quedar embarazada.
- Informe a su médico si está amamantando.
- Si está tomando anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas), es posible que no funcionen tan bien cuando esté tomando este medicamento. Tenga cuidado al usar este medicamento y las píldoras anticonceptivas. Y use barreras anticonceptivas adicionales (como los condones).

Mantenga este y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños. Nunca comparta sus medicamentos con otras personas. Use este medicamento solo por el motivo que indicó el médico.

¿Qué seguimiento necesito?

Acuda a sus citas regulares con su médico. Acuda a sus citas regulares para sus análisis de sangre. Los análisis de sangre ayudan a su médico a verificar los efectos secundarios del medicamento.

¿Cuál es el número de teléfono del médico? (585) 486-0901

♦ 400 Red Creek Dr., Suite 240, Rochester, NY 14623 ♦ 125 Lattimore Rd., Suite G-110, Rochester, NY 14620 ♦